

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT - SECRETARIAT
Intrare nr. 598
ziua 23. luna 05. anul 2016

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



AVERTIZAREA NR. 36 / 23.05.2016

Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum** (putregaiul alb), **Phomopsis helianthi** (frangerea tulpinilor), **Plasmopara helianthi** (mana florei soarelui). – FLOAREA SOARELUI

Topsin 70 WDG = 1,0 kg/ha sau **Acanto Plus** = 0,6 L/ha (2 tratamente) sau **Topsin 500 SC** = 1,4 L/ha (2 tratamente in vegetatie) ;

Tratamentul se va aplica in faza fenologica de 6-8 perechi de frunze.

La depistarea manei florei soarelui (plasmopara helianthi) se recomanda eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora in saci de plastic sau hartie si distrugerea lor prin ardere

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 37 / 23.05.2016

Eurygaster spp. (plosnita cerealelor) , **Anisoplia spp** (carabuseii cerealelor), **Lema melanopa** (gandacul balos) , **Complex boli boli foliare si ale spicului** – CEREALE PAIOASE

Insecticide : **Faster 10 CE** = 100 ml/ha sau **Alfametrin 10 EC** = 100 ml % ha sau **Biscaya 240 OD** = 0,2 l/ha sau **Fury 10 EC** = 0,1 L/ha . + **Fungicid** : **Topsin AL 70 PU** = 1 KG / HA , **Trineo 25 EW** = 0,5 L / ha , **Evolus** = 1,0 L / ha , **Mystic Extra** = 0,750 L /ha etc .

Tratamentul se va aplica atunci cand majoritatea larvelor de plosnita sunt de varsta a III a si la densitati de 3 exemplare / mp pentru culturile destinate producerii graului de sãmanță si de 5 exemplare / mp pentru culturile destinate graului de consum ; pentru carabuseii cerealelor la un PED = 5 excmplare / mp , iar pentru gandacul balos la un PED = 250 larve / mp .

Tratamentul se va aplica in conditiu meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 38 / 23 .05.2016

Boli foliare si daunatori – **CASTRAVETI , PEPENI**

1. **Curzate Manox** = 2,5 kg/ha (0,25%) + **Systhane Forte** = 0,02% (0,2L/ha) + **Mospilan 20 SP** = 0,0125%

2. **Antracol 70 WP** = 0,2% + **Trineo 25 EW** = 0,5 L/ha + **Faster 10 CE** = 0,03%

Tratamentul se va executa la depistare , se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor), veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
Ing. Borjoiu Liviu