



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 42 / 23.05.2019

Hyphantria cunea (omida paroasa a dudului) – ALINIAMENTE SI PARCURI

Fury 10 EC = 0,01% sau Novadim Progress = 0,1 % sau Kaiso Sorbie 5 WG = 0,015 sau Faster 10 CE = 0,02% sau Calypso 480 SC = 0,02%

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Pe suprafetele mici si la pomii izolati , se recomanda taierea cuiburilor , culegerea si arderea imediata , inainte ca larvele sa paraseasca cuibul, lucrarea repetandu-se din 7 in 7 zile.

Tratamentul chimic va incepe la aparitia larvelor de varsta a II a si se va termina in 5-6 zile . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 43 / 23.05.2019

Hylemia antiqua (Musca cepei), Thrips t. (Tripsul comun) ,etc. + Peronospora destructor (Mana) – CEAPĂ

Insecticide

Benevia = 0,75 L / ha sau Mavrik 2 F = 0,05 % sau Mospilan 20 SP = 0,075 KG / ha

Fungicide

Ridomil Gold MZ 68 WG = 2,5 kg / ha sau Polyram DF = 0,075 sau Dithane M 45 = 0,02 %

Tratamentul se va executa la depistare si se va repeta la 8-10 zile.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 44 / 23.05.2019

Lacuste (*Calliptamus italicus* , *Lacusta migratoria* , *Dociostaurus marocanus*) , etc
– **DIFERITE CULTURI**

Faster 10 CE = 0,2 L/ha pentru lucerna si soia .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT
<https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va face la depistare si se va incheia inainte de trecerea daunatorilor in faza gregara.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 45 /23 .05.2019

Leptinotarsa decemlineata larve (gandacul din Colorado) , afide + Mana (*Phytophthora I.*). Altrnaria (*Alternaria sp ..*) - **CARTOF**

Insecticide

Mospilan 20 SP = 0,06 kg/ha sau Biscaya 240 OD = 0,2 L/ha sau Karate Zeon = 0,2 L/ha sau Mavrik 2 F = -0,2 L/ ha ;

Fungicide

Poliram DF = 1,8 kg / ha / ha sau Rover 500 SC = 2 L/ ha sau Bravo 500 SC = 1,5 L/ ha sau Drago 75 WP = 2 L/ ha

AVERTIZAREA NR. 46 / 23.05.2019

Eurygaster spp. (plosnita cerealelor) , Anisoplia spp (carabuseii cerealelor),
Lema melanopa (gandacul balos) + Complex boli boli foliare si ale spicului –
CEREALE PAIOASE

Insecticide : Faster 10 CE = 100 ml/ha sau Alfametrin 10 EC =100 ml % ha sau Biscaya 240 OD = 0,2 l/ha sau Fury 10 EC = 0,1 L/ha . + Fungicid : Topsin AL 70 PU = 1 KG / HA , Trineo 25 EW = 0,5 L / ha , Evolus = 1,0 L / ha , Mystic Extra = 0,5 L /ha etc .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT
<https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica atunci cand majoritatea larvelor de plosnita sunt de varsta a III a si la densitati de 3 exemplare / mp pentru culturile destinate producerii graului de sămânță si de 5 exemplare/ mp pentru culturile destinate graului de consum ; pentru carabuseii cerealelor la un PED = 5 exemplare / mp , iar pentru gandacul balos la un PED = 250 larve / mp .

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul va incepe la aparitia primelor larve de varsta a III a (inainte de intrarea in stadiul de prenimfa). Tratamentul se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 , al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Coordonator ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

A handwritten signature in black ink.