

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM.SĂRAT

Intrare nr.....
ziua.....luna.....anul.....

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



AVERTIZAREA NR. 94 / 07 .09.2020

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **RAPITA**.

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

DAUNATORI

CYCLONE / (FASTER GOLD 50 EC - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|-----------|--|----------|---------|
| Rapita | Dăunători | Purcii de pamant, gandacul lucios al rapitei, gargarita semintelor de crucifere, tantarul silicvelor | 0,1 l/ha | 42 zile |
|--------|-----------|--|----------|---------|

POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|-----------|---|-------------------------------|---------|
| Rapita | Dăunători | Purcii cruciferelor, gandacul lucios, afide | 30-50 ml/hi apa (0,03-0,05 %) | 30 zile |
|--------|-----------|---|-------------------------------|---------|

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|-----------|---|-------------|---|
| Rapita | Dăunători | Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei | 0,150 kg/ha | - |
|--------|-----------|---|-------------|---|

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|-----------|--|-----------------------------------|---------|
| Rapita | Dăunători | puricele cruciferelor, viespea rapitei, fluturele alb al verzel, buha verzel | 0,15 L/ha se aplica la avertizare | 35 zile |
|--------|-----------|--|-----------------------------------|---------|

FASTAC 10 EC

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------|----------|---------|
| apita | Dăunători | Viespea rapitei | 0.2 L/ha | 49 zile |
|-------|-----------|-----------------|----------|---------|

FASTER 10 CE

| | | | | |
|--------|-----------|-----------------|----------|---|
| Rapita | Dăunători | Viespea rapitei | 0,2 l/ha | - |
|--------|-----------|-----------------|----------|---|

KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------------------|-----------|---|------------|---------|
| Rapita pentru ulei | Dăunători | Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita | 0,15 kg/ha | 28 zile |
|--------------------|-----------|---|------------|---------|

DECIS EXPERT 100 EC

| | | | | |
|--------|-----------|--|----------|---------|
| Rapita | Dăunători | Gargarite, tantarul siliveilor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide | 75 ml/ha | 45 zile |
|--------|-----------|--|----------|---------|

Tratamentul se aplica la depistare .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se aplica la depistare

BOLI

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------------------|------|--|----------|---------|
| Rapita pentru ulei | Boli | putregalul alb, putregalul cenușu , putregalul negru, alternarioza, falnarea | 0.5 l/ha | 30 zile |
|--------------------|------|--|----------|---------|

TOPSIN 70 WDG

| | | | | | |
|--------|------|---|-----------|---------|---|
| Rapita | Boli | Putregaiul alb , putregaiul cenușiu, alternarioza, fainarea | 1,0 kg/ha | 49 zile | - |
|--------|------|---|-----------|---------|---|

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|--------------------|------|--|-------------------------------------|--|--|
| Rapita pentru ulei | Boli | Putregaiul alb, alternarioza, fainarea, patarea bruna | 1,0 l/ha | | |
| Rapita pentru ulei | Boli | tratament pentru cresterea rezistentei plantelor la iernare si la cadere si pentru combaterea patogenului Phoma lingam | 0,5 l/ha (tratament aplicat toamna) | | |

MIRAGE 45 EC

| | | | | | |
|--------|------|--------------------|----------|---|---|
| Rapita | Boli | putregaiul alb | 1,0 l/ha | - | - |
| Rapita | Boli | putregaiul cenușiu | 1,0 l/ha | - | - |
| Rapita | Boli | alternarioza | 1,0 l/ha | - | - |

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se aplica la depistare .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru , pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deeurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENȚA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

| Data efectuarii tratamentului (ziua, luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Tim-pul aplicării | Tratamentul efectuat | | | | Numele, pre-numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|-------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------|--|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni | Denumirea ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața, ha | | | |
| | | | | | | | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

Sef birou,
 Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit,
 Ing. Liviu BORJOIU

AVERTIZAREA NR. 93 / 07.09.2020

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **TOMATE CICLUL II**.

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

DAUNATORI

AFFIRM

| | | | | |
|------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---|
| tomate sera si solaril | Dăunători | Minierul frunzelor de tomate | 1,5 kg/ha | - |
|------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---|

ALVERDE

| | | | | |
|------------------------|-----------|------------------------------|----------|--------------|
| tomate sera si solaril | Dăunători | Minierul frunzelor de tomate | 1,0 l/ha | Pauza 3 zile |
|------------------------|-----------|------------------------------|----------|--------------|

VOLIAM TARGO

| | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|---|--------------|
| tomate sera si solaril | Dăunători | Molla miniera a frunzelor | 0,8 l/ha | Pauza 3 zile |
| Tomate in solar | Dăunători | palanjenul rosu comun, musca miniera | 0,6 - 0,8 l/ha (In functie de nivelul de infestare) | Pauza 3 zile |
| Tomate sera si solaril | Dăunători | Omiida fructelor, buha legumelor | 0,8 L/ha | Pauza 3 zile |

VERTIMEC PRO

| | | | | |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|----------|--------------|
| Tomate (camp si sere) | Dăunători | Palanjeni, acarieni, tripsi, muste | 1,2 l/ha | Pauza 3 zile |
| Tomate (camp si sere) | Dăunători | Palanjeni, acarieni, tripsi, muste | 1,2 l/ha | Pauza 3 zile |

VERTIMEC 1,8% EC

| | | | | |
|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------|
| Tomate camp | Dăunători | Acarieni | 60 mL/hl | Pauza 3 zile |
| tomate sera | Dăunători | Musca miniera | 60-80 mL/hl | Pauza 3 zile |

FASTER 10 CE

| | | | | |
|-------------|-----------|-------------------|------------------|--|
| Tomate camp | Dăunători | p` aduchele verde | 0,02% (0,2 l/ha) | |
|-------------|-----------|-------------------|------------------|--|

LASER 240 SC

| | | | | |
|-------------|-----------|------------------------------|-------|--------------|
| tomate sera | Dăunători | musca miniera a solanaceelor | 0,05% | Pauza 3 zile |
|-------------|-----------|------------------------------|-------|--------------|

CORAGEN

| | | | | |
|--------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|
| Tomate | Dăunători | Omiida fructelor, molla tomatelor | 175 ml/ha | Pauza 1 zi |
|--------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|

DELTAM

| | | | | |
|-------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
| Tomate camp | Dăunători | Afide | 8,0 mL in 10 L apa/100 m ² | Pauza 3 zile |
| Tomate camp | Dăunători | Omiizi defoliatoare | 5,0 mL in 10 L apa/100 m ² | Pauza 3 zile |

FASTAC 10 EC

| | | | | |
|--------|-----------|-----------------------|-------|--------------|
| Tomate | Dăunători | Gandacul din Colorado | 0,01% | Pauza 3 zile |
|--------|-----------|-----------------------|-------|--------------|

KOHINOR 200 SL/(TALENT-a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|---|
| tomate sera si solaril | Dăunători | minierul frunzelor de tomate | 1,0 l/ha | - |
| Tomate si castraveti solari | Dăunători | tripsul tutunului | 0,75 l/ha | - |
| tomate solar | Dăunători | musculi`ta alb`a de ser`a | 0,075% (0,75 l/ha) | - |

FLIPPER

| | | | | |
|-------------------------|-----------|---|-----------|---|
| tomate (camp) | Dăunători | Afide, musculita alba de sera, acarieni | 20,0 L/ha | - |
| Tomate spatii protejate | Dăunători | Afide, musculita alba de sera, acarieni | 16,0 L/ha | - |

APACHE/(VERTAB - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|---------------|-----------|---|--|--------------|
| tomate (sera) | Dăunători | Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid | 0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hi) se aplica la aparitia primelor form | Pauza 3 zile |
| tomate (sera) | Dăunători | Musca miniera | 0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hi) se aplica inaintea eclozarii primel | Pauza 3 zile |
| Tomate camp | Dăunători | Acarianul rosu comun, acarianul lat | 0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hi) se aplica la aparitia primelor form | Pauza 3 zile |
| Tomate camp | Dăunători | Musca miniera | 0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hi) se aplica inaintea eclozarii primel | Pauza 3 zile |

BERMECTINE

| | | | | |
|---------------|-----------|---|------------------------------|--------------|
| tomate (sera) | Dăunători | Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid | 0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL) | Pauza 3 zile |
| tomate (sera) | Dăunători | Molla tomatelor | 1,0 L/ha (100 mL/hL) | Pauza 3 zile |
| tomate (sera) | Dăunători | Muste | 0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL) | Pauza 3 zile |
| Tomate camp | Dăunători | Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele | 0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL) | Pauza 3 zile |

PROXIMO

| | | | | |
|---------------|-----------|--|---|--------------|
| tomate (sera) | Dăunători | Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului | 50-75 ml/hi (max. 1,25 l/ha) se aplica la aparitia daunatorului | Pauza 3 zile |
|---------------|-----------|--|---|--------------|

SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|---------------|-----------|---------------|---|--------------|
| tomate (sera) | Dăunători | Musca miniera | 0,09%(0,9 l/ha in 1000 l.apa) nu se aplica in timpul inforitulu | Pauza 3 zile |
|---------------|-----------|---------------|---|--------------|

JUVINAL 10 EC

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-------|--------------|
| tomate (solaril) | Dăunători | Musulita alba de sera | 0,05% | Pauza 3 zile |
|------------------|-----------|-----------------------|-------|--------------|

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|-------|---------------|
| Tomate camp | Dăunători | Tripsul californian | 0,04% | Pauza 7 zile |
| Tomate spatii protejate | Dăunători | Tripsul californian | 0,04% | Pauza 14 zile |

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|-------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Tomate camp | Dăunători | paducele verde al solanaceelor | - | |
| Tomate camp | Dăunători | omida fructelor | 0,05%(0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha) | |

NISSORUN 10 WP

| | | | | |
|--------|-----------|----------------------|-----------|--------------|
| Tomate | Dăunători | Acarianul rosu comun | 1,0 kg/ha | Pauza 3 zile |
|--------|-----------|----------------------|-----------|--------------|

MATCH 050 EC

| | | | | |
|-------------------------|-----------|--|------------------|--------------|
| Tomate spatii protejate | Dăunători | Tripsul tutunului, tripsul californian | 0,2% (200 ml/hi) | Pauza 7 zile |
|-------------------------|-----------|--|------------------|--------------|

BOLI

ACROBAT MZ 69 WG

| | | | | |
|--------|------|------|-----------|--------------|
| Tomate | Boli | Mană | 2,0 kg/ha | Pauza 3 zile |
|--------|------|------|-----------|--------------|

CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|------|--|---|---------------|
| Tomate | Boli | Basicarea fructelor, patarea pustulara | 2,0 kg/ha (0,2%) se aplica in timpul vegetatiei la avertizare | Pauza 10 zile |
|--------|------|--|---|---------------|

DITHANE M-45

| | | | | |
|--------|------|---------------------------------|---------------|----------|
| Tomate | Boli | b`a`sicarea fructelor de tomate | 0,20% | Pauza 14 |
| Tomate | Boli | p`atarea cafenie a tomatelor | 0,20% | Pauza 21 |
| Tomate | Boli | p`atarea alb`a a frunzelor | 0,20% | Pauza 14 |
| Tomate | Boli | mana tomatelor | 2,0-2,5 kg/ha | Pauza 14 |
| Tomate | Boli | cancerul bacterian | 0,20% | Pauza 14 |

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|------|----------------|-----------|--------------|
| Tomate | Boli | Mana tomatelor | 2,5 kg/ha | Pauza 7 zile |
|--------|------|----------------|-----------|--------------|

VONDOZEB / (MANZATE - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|------|--|-----------------|--------------|
| Tomate | Boli | Basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, patarea alba a frunzelor, cancerul bacterian | 0,2% | Pauza 3 zile |
| Tomate | Boli | Mana tomatelor | 2,0 - 2,5 kg/ha | Pauza 3 zile |

ORTIVA TOP

| | | | | |
|-----------------------------------|------|--|----------|--------------|
| Tomate (camp si spatii protejate) | Boli | Putregalul cenuziu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza | 1,0 l/ha | Pauza 7 zile |
|-----------------------------------|------|--|----------|--------------|

THIOVIT JET 80 WG

| | | | | |
|-------------|------|--|-----------|------------|
| Tomate camp | Boli | Fainarea (efect secundar asupra acarienilor) | 5,0 kg/ha | Pauza 1 zi |
|-------------|------|--|-----------|------------|

IMPACT 25 SC / (TOPGUARD 25 SC-a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|------|----------|------------------|--|
| Tomate | Boli | Fainarea | 0,2 L/ha (0,02%) | |
|--------|------|----------|------------------|--|

CALIZI/(BOLERO - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|------|---|--|--------------|
| Tomate | Boli | Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie | 0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei de a 5-a inflorescente p | Pauza 3 zile |
|--------|------|---|--|--------------|

BOUILLIE BORDELAISE WDG

| | | | | |
|--------|------|---|-------------------|---|
| Tomate | Boli | p`atarea brun`a a frunzelor | 0,75% (7,5 kg/ha) | - |
| Tomate | Boli | p`atarea frunzelor si b`a`sicarea fructelor | 0,75% (7,5 kg/ha) | - |
| Tomate | Boli | p`atarea pustular`a | 0,75% (7,5 kg/ha) | - |
| Tomate | Boli | mana tomatelor | 0,75% (7,5 kg/ha) | - |

CABRIO TOP

| | | | | |
|--------|------|--|-----------------|--------------|
| Tomate | Boli | Mana, Fainarea, Patarea alba, Patarea cafenie, patarea bruna | 1,5 - 2,0 kg/ha | Pauza 7 zile |
|--------|------|--|-----------------|--------------|

DAGONIS

| | | | | |
|------------------------|------|-------------------------------|--|--|
| Tomate | Boli | Fainarea | 0,6 L/ha | |
| Tomate | Boli | Alternarioza, patarea cafenie | 1,0 L/ha | |
| tomate sefa si solarii | Boli | Fainarea | 0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la cocerea depl | |
| tomate sera si solarii | Boli | Alternarioza | 1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la cocerea depl | |

REVUS 250 SC

| | | | | |
|------------------------|------|----------------|----------|--------------|
| tomate sera si solarii | Boli | Mana tomatelor | 0,6 l/ha | Pauza 3 zile |
|------------------------|------|----------------|----------|--------------|

ARMETIL M/(MANOXIN MIX-a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|-----------------------|------|------|-----------|---------------|
| Tomate (camp si sere) | Boli | Mana | 2,5 kg/ha | Pauza 21 zile |
|-----------------------|------|------|-----------|---------------|

VITRA 50 WP / (CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|-----------------------|------|---|---------------|--------------|
| Tomate (camp si sere) | Boli | Mana, alterari toza, patarea bacteriana, putregalul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate | 1,5-2,0 kg/ha | Pauza 3 zile |
|-----------------------|------|---|---------------|--------------|

MERPAN 50 WP

| | | | | |
|--------|------|-----------------------------|-----------|--|
| Tomate | Boli | mana tomatelor | 0,2% | |
| Tomate | Boli | Patarea alba a frunzelor | 0,2% | |
| Tomate | Boli | Patarea cafelei a tomatelor | 0,2-0,25% | |

DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|-------------|------|--|---------------|------------------|
| Tomate | Boli | Mana tomatelor | 2,0-2,5 kg/ha | Pauza 14-21 zile |
| Tomate | Boli | Patarea frunzelor si basiacarea fructelor de tomate, patarea cafelei, patarea alba a frunzelor, cancarul bacterian | 0,20% | Pauza 14-21 zile |
| Tomate camp | Boli | Antracnoza tomatelor | 0,2% | Pauza 14-21 zile |

WINNER M 80

| | | | | |
|--------|------|----------------|-----------|--------------|
| Tomate | Boli | Mana tomatelor | 2,0 kg/ha | Pauza 3 zile |
|--------|------|----------------|-----------|--------------|

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deeurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN




4

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 92 / 04.09.2020

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agenților de daunare la cultura de **VARZA**.

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare se recomandă utilizarea următoarelor produse de protecția plantelor omologate :

DAUNATORI

DECIS 25 WG

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------------------|--------|---|
| varza | Dăunători | Buha verzei | 30 g/ha (0,005 %) | 7 zile | - |
|-------|-----------|-------------|-------------------|--------|---|

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comercială)

| | | | | | |
|------------|-----------|--|---|--------|---|
| varza | Dăunători | fluturele alb al verzei, paduchele cenușiu al verzei | 0,015% (0,09 l/ha) se aplică la avertizare | 7 zile | - |
| varza camp | Dăunători | Buha verzei | 0,015% (0,075 l/ha) se aplică la avertizare | 7 zile | - |

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comercială)

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| varza | Dăunători | Paduchele cenușiu al verzei | 0,125 kg/ha (0,0125%) | - | - |
| varza | Dăunători | Buha verzei | 0,250 kg/ha (0,025%) | - | - |

Tratamentul se repetă la 6 – 8 zile.

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Respectați cu strictețe **perioadele de remanentă** a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS, Ordinul comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clădi obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii și se returnează distribuitorului. Fermierul trebuie să dețină un contract cu o unitate de preluare a deșeurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp și apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului anexat.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Fermă (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

| Data efectuarii tratament. (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Tipul aplicării | Tratamentul efectuat | | | | Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|-----------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------|--|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/dăunător/buruli | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața, ha | | | |
| | | | | | | | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

Sef birou ,
 Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
 Ing. Liviu BORJOI