

Str. Frăsinet, nr. 3.  
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

**AVERTIZAREA NR. 1 / 05 .01.2022**

**TRATAMENT LA SOL – SPAȚII PROTEJATE**

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare se recomandă utilizarea următoarelor produse de protecția plantelor omologate.

**RAISAN 51**

|                             |           |  |   |
|-----------------------------|-----------|--|---|
| Dezinfectia solului in sere | Dăunători | Meloidogyne sp. (Nematodul galicolic al radacinilor)                                     | 700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat |
| Dezinfectia solului in sere | Buruieni  | Buruieni anuale si perene  | 700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat |
| Dezinfectia solului in sere | Boli      | Fusarium sp. (Fuzarioza), Phytophthora sp. (Mana), Verticillium sp. (Ofilirea vasculara) | 700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat |

**BASAMID GRANULE**

|  |           |  |   |
|--|-----------|--|---|
| Legume din solarii infiintate prin rasad | Dăunători | Coropisnita                                | 250 kg/ha   |
| Tomate sera                              | Boli      | Mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculara | 500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de p  |
| Tomate sera                              | Dăunători | Nematodul galicolic al radacinilor         | 500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de pl |

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța 41 / 2007.

Respectați cu strictețe perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> SMR 10 - Introducerea pe piața a produselor de protecție a plantelor

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului.

Sef Birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU



Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 2 / 05 .01.2022**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la diferite culturi pentru combaterea **Soarecelui de Camp – MICROTUS ARVALIS** .

**BROMAKOL**

|                                     |           |                 |                              |    |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|----|
| Cereale, pomi fructiferi, pepiniera | Dăunători | Soarele de camp | 25-50g momeli/galerie activa | -- |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------|----|

Ca urmare a nesustinerii la nivelul UE de către notificator a substanței active bromadiolon, certificatul de omologare se retrage la data de **31.05.2021**. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de **01.12.2021**) la care se adaugă 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de **01.06.2022**).

**Tratamentul se aplica la depistare .**

Momentul aplicării cel mai potrivit pentru preintimpinarea invaziilor și începerea tratamentului de combatere este atunci când numărul coloniilor ( vetrelor de atac ) ajunge la peste – 5 colonii / ha.

- După terminarea tratamentelor vor fi fixate și puse la loc vizibil placarde cu interdicția „ TEREN OTRAVIT ” scrise pe fond galben cu litere negre . Placardele vor fi așezate obligatoriu în colturile terenului tratat și la toate caile de acces .

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007.

Respectați cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protecție a plantelor , a normelor de lucru , pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine , din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicățiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clădi obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii și se returnează distribuitorului. Fermierul trebuie să dețină un contract cu o unitate de preluare a deșeurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp și apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro));

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - [https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați**

**Producătorii agricoli sunt obligați să tina evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului anexat.**

Sef birou ,  
 Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
 Ing. Liviu BORJOIU





AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

Str. Frâsinet, nr. 3.  
Loc. Buzău, Jud. Buzău

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 3 / 05 .01.2022**

**Erwinia amylovora (Focul bacterian al rozaceelor) – MAR, PAR, GUTUI**

Taierea mecanica a ramurilor cu simptome la o distanta de cel puțin 50 cm sub limita prezentei simptomelor. Intregul material vegetal se va strage si se va distruge prin ardere. Instrumentele folosite la taiere vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare cu **hipoclorit de sodiu 10 %**, concentratie de 1 %. Ulceratiile de pe trunchi vor fi extirpate inclusiv tesutul marginal de 2 cm, iar rana se dezinfecteaza. Ranile rezultate la taiere, vor fi dezinfectate cu **1 % oxicolorura de cupru**. Lucrarea se va executa inainte de taierile obisnuite din livada si pana la intrarea in vegetatie a pomilor.

**AVERTIZAREA NR. 4 / 05 .01.2022**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare -

**- POMI FRUCTIFERI – Repaus vegetativ**

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarelor produse de protectia plantelor omologate.

**DAUNATORI**

**MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)**

|      |           |                       |  |         |   |
|------|-----------|-----------------------|--|---------|---|
| Mar  | Dăunători | Paducele din San Jose | 0,450 kg/ha +0.5 % adjuvant (tratament de iarna) | 14 zile | - |
| Prun | Dăunători | Paducele din San Jose | 0,450 kg/ha +0,5 % adjuvant (tratament de iarna) | 14 zile | - |

**JUVINAL 10 EC**

|                  |           |                       |  |   |   |
|------------------|-----------|-----------------------|--|---|---|
| plantatii de mar | Dăunători | Paducele din San Jose | 0,1% (larve hibernante in per. de iarna) | - | - |
| Prun             | Dăunători | Paducele din San Jose | 0,1% (larve hibernante in per. de iarna) | - | - |

**ESTIUOIL/( YAGOS-a doua denumire comerciala)**

|          |           |                       |                              |   |   |
|----------|-----------|-----------------------|------------------------------|---|---|
| Cais     | Dăunători | Paducele din San Jose | 0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha) | - | - |
| Cires    | Dăunători | Paducele din San Jose | 0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha) | - | - |
| gutui    | Dăunători | Paducele din San Jose | 0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha) | - | - |
| Mar      | Dăunători | Paducele din San Jose | 0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha) | - | - |
| Nectarin | Dăunători | Paducele din San Jose | 0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha) | - | - |
| Par      | Dăunători | Paducele din San Jose | 0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha) | - | - |
| Piersic  | Dăunători | Paducele din San Jose | 0,75-1,0 L/hL (3,75-15 L/ha) | - | - |

**OVIPRON TOP/(VERNOIL - a doua denumire comerciala)**

|                            |             |   |   |         |
|----------------------------|-------------|---|---|---------|
| Cais                       | • Dăunători | Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide | 2500 ml/100 L apa sau<br>1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti | 20 zile |
| Cires                      | • Dăunători | Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide | 2500 ml/100 L apa sau<br>1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti | 20 zile |
| Nectarin                   | • Dăunători | Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide | 2500 ml/100 L apa sau<br>1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti | 20 zile |
| Piersic                    | • Dăunători | Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide | 2500 ml/100 L apa sau<br>1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti | 20 zile |
| Pomi fructiferi (mar, par) | • Dăunători | Paduchele din San Hose, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, puricele melifer al parului, afide, paduchele lanos                           | 2500 ml/100 L apa sau<br>1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti | 20 zile |
| Prun                       | • Dăunători | Paduchele din San Hose, paduchele tepos al piersicului, paduchele testos al prunului, eriofide, paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, acarieni, afide | 2500 ml/100 L apa sau<br>1500 ml/100 L apa in amestec cu un insecti | 20 zile |

**PLANTOIL**

|                                |           |  |                             |
|--------------------------------|-----------|--|-----------------------------|
| Pomi fructiferi (samburoase)   | Dăunători | Quadraspidiotus perniciosus (Paduchele din San Jose) | 0,75-1,0 % (3,75-15,0 L/ha) |
| pomi fructiferi (semin' toase) | Dăunători | Quadraspidiotus perniciosus (Paduchele din San Jose) | 0,75-1,0 % (3,75-15,0 L/ha) |

**BOLI**

**ALCUPRAL 50 PU**

|       |      |  |  |
|-------|------|--|--|
| gutui | Boli | Erwinia amylovora (Focul bacterian)  | 4,5 kg/ha (0,3%) Se aplica prefloral                 |
| gutui | Boli | Erwinia amylovora (Focul bacterian)  | 0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa |
| Mar   | Boli | Venturia inaequalis (Rapanul marului)  | 1,5-2,0 kg/ha  |
| Mar   | Boli | Erwinia amylovora (Focul bacterian)  | 2,0 kg/ha (0,2%) Se aplica prefloral;                |
| Mar   | Boli | Erwinia amylovora (Focul bacterian)  | 0,6 kg/ha (0,04%) Se aplica postfloral in 1500 L apa |
| Par   | Boli | Venturia inaequalis (Rapanul marului); Erwinia amylovora (Focul bacterian)     | 3,0 kg/ha (0,3%) in 1000 L apa                       |
| Prun  | Boli | Polistigma rubrum (Patarea rosie a frunzelor de prun); Monilia sp. (Monilioza) | 2,0 kg/ha (0,2%)                                     |
| Prun  | Boli | Stigmia carpophila (Ciuruirea frunzelor)                                       | 1,5-2,0 kg/ha  |

**CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)**

|          |      |                        |  |           |
|----------|------|------------------------|--|-----------|
| Cais     | Boli | Basicarea frunzelor    | 2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf | 21 zile - |
| Cais     | Boli | Monilioza              | 0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare | 21 zile - |
| Cires    | Boli | Monilioza              | 0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare | 21 zile - |
| Mar      | Boli | Rapan, focul bacterian | 0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica prefloral               | -         |
| Nectarin | Boli | Basicarea frunzelor    | 26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti | 21 zile - |
| Nectarin | Boli | Basicarea frunzelor    | 2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf | 21 zile - |
| Piersic  | Boli | Basicarea frunzelor    | 2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf | 21 zile - |
| Piersic  | Boli | Monilioza              | 0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare | 21 zile - |
| Piersic  | Boli | Basicarea frunzelor    | 26 ml/100 mp. se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti | 21 zile - |
| Prun     | Boli | Monilioza              | 0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare | 21 zile - |
| Visin    | Boli | Monilioza              | 0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare | 21 zile - |

**BOUILLIE BORDELAISE WDG**

|         |      |   |                  |   |      |
|---------|------|---|------------------|---|------|
| gutui   | Boli | Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)   | 7,5 kg/ha        | - | -    |
| Mar     | Boli | Venturia inaequalis (rapanul marului)   | 0,5% (7,5 kg/ha) | - | -    |
| Mar     | Boli | Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)   | 7,5 kg/ha        | - | -    |
| Par     | Boli | Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)   | 7,5 kg/ha        | - | -    |
| Par     | Boli | Erwinia amylovora (focul bacterian al rosaceelor)   | 7,5 kg/ha        | - | -    |
| Piersic | Boli | Taphrina deformans (basicarea frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (moniliza)              | 0,5% (5,0 kg/ha) | 3 | zile |
| Prun    | Boli | Polystima rubrum (patarea rosie a frunzelor de prun), Stigmia carpophyla (ciuirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza) | 0,5% (5,0 kg/ha) | 3 | zile |
| Cires   | Boli | Blumeriella jaapi (patarea rosie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)        | 0,5% (5,0 kg/ha) | 3 | zile |
| Visin   | Boli | Blumeriella jaapi (patarea rosie a frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuirea micotica a frunzelor), Monilinia spp. (monilioza)        | 0,5% (5,0 kg/ha) | 3 | zile |

**ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comerciala)**

|        |      |  |                |   |   |
|--------|------|--|----------------|---|---|
| gutui  | Boli | Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor) | 3,75-5,0 kg/ha | - | - |
| Mar    | Boli | Venturia spp (rapan)                           | 3,75-5,0 kg/ha | - | - |
| Mar    | Boli | Erwinia spp. (focul bacterian)                 | 7,5 kg/ha      | - | - |
| Mar    | Boli | Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor) | 3,75-5,0 kg/ha | - | - |
| Mosmon | Boli | Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor) | 3,75-5,0 kg/ha | - | - |
| Par    | Boli | Neonectria sp. (Cancerul deschis al ramurilor) | 3,75-5,0 kg/ha | - | - |

Tratamentul se va executa dupa efectuarea lucrarilor de igiena culturala ,la temperaturi de +4 °C ; +5 °C , la pomii fara apa , chiciura sau polei .Pentru speciile pomicole semintoase tratamentul se va efectua pana la faza de infrunzitul mugurilor – faza de urechiusa ,iar pentru speciile pomicole samburoase tratamentul se va efectua pana la sfarsitul repausului vegetativ – faza de buton alb sau roz .

-Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Se vor respecta normele de protectia muncii ,mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, in termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro));

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul [https://www.anfd.ro/sanatare/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfd.ro/sanatare/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Intocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU



Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul)  
 Ferma (nume/număr,  
 adresa).....

## REGISTRU

### DE EVIDENȚA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

| Data efectuarii tratamentului.<br>(ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Tipul aplicării | Tratamentul efectuat                        |                      |                               |           |                             | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|---|---|-----------------|---|----------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|---|--|---|
|   |   |                 | Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața | Cantități utilizate (kg, l) |   |  |   |
|   |   |                 |   |                      |                               |           |                             |   |  |   |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).