


MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



Telefon / fax: 0238.437.884
 e-mail : ofbuzau@anf.ro

În scopul informării și constientizării beneficiarilor ajutorului de minimis pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2022 cu privire la obligativitatea de a utiliza numai produse omologate pe teritoriul României cu respectarea dozei/cultura/organism dăunător, va transmitem atasat lista produselor de protecție a plantelor omologate în România pentru cultura de tomate, cu rugămintea ca aceasta să fie distribuită beneficiarilor, astfel încât să evităm înregistrarea de depășiri ale limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în probele de tomate analizate.

Va multumim pentru buna colaborare!

PPP OMOLOGATE ÎN ROMÂNIA PENTRU CULTURA DE TOMATE

FUNGICIDE

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	ALLSTAR 250 SC	Phytophthora infestans (Mana tomatelor), Alternaria spp. (Alternarioza)	0,75-1,0 L/ha (în funcție de gradul de infestare)
2.	AZUMO WG	Fainarea	2,0 kg/ha
3.	BOTECTOR	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)	1,0 kg/ha
4.	BOUILLIE BORDELAISE WDG	Pseudomonas tomato (patarea pustulară), Alternaria solani (alternarioza), Phytophthora infestans (mana), Xanthomonas vesicatoria (bășicarea fructelor)	0,75% (7,5 kg/ha)
5.	CABRIO TOP	Mana, fainarea, patarea albă, patarea cafenie, patarea brună	1,5 - 2,0 kg/ha
6.	CALIZI / (SINPRO - a doua denumire comercială)	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie	0,8 l/ha
7.	CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comercială)	Mana solanaceelor, patarea brună	0,15% (1,5 kg/ha)
8.	CARIAL STAR	Mana, alternarioza	0,6 l/ha pentru culturi în câmp și spații protejate
9.	CASINO ROYALE	Alternaria spp. (Alternarioza)	1,5 Kg/ha
10.	CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comercială)	Bășicarea fructelor, patarea pustulară	2,0 kg/ha (0,2%)
11.	CUPROFIX ULTRA / NOVICURE-a doua denumire comercială	Mana, alternarioza, putregaiul rădăcinilor și fructelor, bășicarea fructelor, patarea pustulară	1,6-2,4 kg/ha
12.	CUPROXAT	Mana, alternarioza	3,0-4,0 l/ha

	FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)	Mana Mana	5,3 l/ha pentru culturi în spații protejate 53 ml/100 mp pentru culturi în spații protejate
13.	CURENOX 50	Phytophthora infestans (mana tomatelor), Alternaria solani (alternarioza)	1,5-2,0 kg/ha
14.	DAGONIS	Fainarea	0,6 L/ha
		Alternarioza, patarea cafenie	1,0 L/ha
		Fainarea	0,6 L/ha
		Alternarioza	1,0 L/ha
15.	DIFCOR 250 EC	Alternarioza, putregaiul cenușiu, putregaiul alb	0,5 l/ha
16.	EQUATION PRO	Phytophthora infestans (mana tomatelor), Xanthomonas vesicatoria (basicarea fructelor)	0,4 kg/ha
17.	FLOSUL	Fainarea	2,0 L/ha
18.	FLOWBRIX / (COPPER-FIELD - a doua denumire comerciala)	Mana, agenti patogeni bacterieni	2,6 ml/10 mp
		Mana, agenti patogeni bacterien	2.5 l/ha
19.	FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)	Mana tomatelor	0,15%
		Caderea rasadurilor	0,15%(4-5 sol./mp)
		Mana tomatelor	0,15%(4-5 sol./mp)
		Rizoctonioza	0,15%(4-5 sol./mp)
20.	KOCIDE 2000	Mana, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%)
21.	LIETO / (ZETANIL - a doua denumire comerciala)	Mana	0,40 kg/ha
22.	MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)	Mana tomatelor	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)
23.	ORIOUS 25 EW / (SALVATOR 25 EW - a doua denumire comerciala)	Alternarioza	0,05% (0,5 L/ha in 1000 L apa)
24.	POLYRAM DF	Patarea cafenie a tomatelor, alternarioza, mana tomatelor, patarea alba a frunzelor de tomate	0,2%
25.	PROPLANT 72,2 SL	Mana de sol a tomatelor	0,15-0,25% (3-5 l sol./m2)
		Mana tomatelor	0,15-0,25% (1,5-2,5 l/ha)
		Căderea plântuțelor	0,15-0,25% (3-5 l sol./m2)
26.	PYRUS 400 SC / (PAPYRUS 400 SC - a doua denumire comerciala)	Putregaiul cenușiu	0,15% (1,5 l/ha)
27.	REFLECT	Fainarea	1,0 l/ha se aplica la culturi in sere si solarii
28.	SCALA	Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu)	2,0 L/ha
29.	SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)	Alternarioza (patarea bruna)	0,5 L/ha
30.	SIGNUM / (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)	Putregaiul cenușiu, fainarea	1,5 kg/ha
31.	SULBARI	Leveillula taurica (fainarea)	5,0 kg/ha
32.	SWITCH 62.5 WG	Putregaiul cenușiu	0,8-1,0 kg/ha
33.	VINCARE 51,7 WG	Mana tomatelor	1,6-2,0 kg/ha

34.	ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF” / (ZEAMA BORDELEZA VALLES - a doua denumire comerciala)	Phytophthora infestans (Mana tomatelor)	3,75-5,0 kg/ha
		Alternaria solani (Alternarioza)	3,75-5,0 kg/ha
35.	DOMARK 10 EC	Fainarea	0,4 L/ha (0,04%)
36.	REVUS 250 SC	Mana tomatelor	0,6 l/ha
		Phytophthora infestans (mana tomatelor)	0,6 L/ha
37.	VITRA 50 WP / (CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha
38.	CYCLO-R LIQUIDO	Mana tomatelor	2,4-4,0 l/ha
39.	KANTAREL	Fainarea (sera)	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)
40.	OMIX / (EDEGAL - a doua denumire comerciala)	Mana, caderea plantutelor	300 mL/ m ³ /substrat
		Mana, caderea plantutelor	5-6 mL/mp
41.	COPFORCE EXTRA / (CUPMAN - a doua denumire comerciala)	Mana, alternarioza	2,0 kg/ha
42.	CUPERTINE SUPER / (COMBIDUO COBRE - a doua denumire comerciala)	Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha
		Mana tomatelor	3,5 kg/ha
43.	TAEGRO	Mana tomatelor	0,37 kg/ha
		Mana tomatelor, fainarea, patarea bruna a frunzelor de tomate (alternarioza)	0,37 kg/ha
44.	THIOVIT JET 80 WG	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha
45.	ARMETIL COBRE / (MANOXIN COMBI-a doua denumire comerciala)	Mana tomatelor	2,5 kg/ha
46.	REVUS 250 SC	Mana tomatelor	0,6 l/ha
		Phytophthora infestans (mana tomatelor)	0,6 L/ha
47.	LUNA PRIVILEGE 500 SC	Putregaiul cenusiu	0,5 l/ha (0,05%)
48.	LUNA SENSATION 500 SC	Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu)	0,6 L/ha
49.	FYTOSAVE	Leveillula taurica (Fainare)	2,0 L/ha
50.	LEGADO / (DIAGONAL - a doua denumire comerciala)	Fainarea	0,8 l/ha
51.	EVALIA / (TAZER - a doua denumire comerciala)	Mana, fainarea, alternarioza	0,05-0,08% (50-80 ml/100 l apa)
52.	PREVICUR ENERGY	Mana, caderea plantutelor, spatii protejate	3 L/ha tratament aplicat prin picurare
		Mana, caderea plantutelor, spatii protejate	3 mL/mp tratament aplicat la sol
53.	SERENADE ASO	Botrytis cinerea (putregaiul cenusiu), Pseudomonas syringae (patarea pustulara a fructelor), Xanthomonas spp. (patarea bacteriana a frunzelor)	4,0-8,0 L/ha
		Fusarium oxysporum (fusarioza)	10,0 L/ha
54.	TELDOR 500 SC	Putregaiul cenusiu, spatii protejate	0,8 L/ha
55.	TRIUMF 40 WG	Mana, spatii protejate	2,0-2,5 kg/ha
56.	BASAMID GRANULE	Mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculara	500 kg/ha
57.	SONATA	Leveillula taurica (fainarea), Oidium lycopersici (fainarea)	5,0-10,0 L/ha
58.	T34 BIOCONTROL	Caderea plantelor	0,5 g/mp de substrat pana la 5 cm adancime
		Caderea plantelor	0,01 g/l sol sau substrat sau

		0,005g/l+0,005 g/l
	Caderea plantelor	10 g/ m ³ de substrat

INSECTICIDE

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	AFFIRM	Minierul frunzelor de tomate, omida fructelor	1,5 kg/ha
2.	AVAUNT 150 EC	Omida fructelor de tomate, omida sfeclei	0,250 l/ha în câmp și spații protejate)
3.	BELTHIRUL	Omizile fructelor	0,25-0,50 kg/ha (800-1000 l apa/ha)
4.	COLUMBO 0,8 MG	Viermii sarma, buha semanaturilor	12 kg/ha
5.	CORAGEN	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha
6.	COROCID SUPER	Coropisnita	20 kg/ha
7.	ERCOLE	Buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha
8.	FLORAMITE 240 SC	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha
9.	FURY GEO	Viermii sarma	12-15 kg/ha
10.	LEBRON 0,5 G	Viermii sarma, buha semanaturilor, Blaniulus guttulatus, centipede, musca morcovului, carabusul de mai	15-20 kg/ha
11.	MICROSED GEO / (SOBEK UP - a doua denumire comerciala)	Agriotes spp. (viermii sarma), Agrotis spp. (buha), Chaetocnema tibialis (puricele sfeclei), Ceutorhynchus pleurostigma (gargarita), Blaniulus guttulatus (sarpele orb, miriapod), Hylemya spp. (muste), Chamaepsila rosae (musca morcovului), Tipula spp. (țânțari)	16-20 kg/ha se aplica prin incorporare la semant sau transplantare
12.	PLINTO 2,5 EC / (ALFASURE 2,5 EC - a doua denumire comerciala)	Omida fructelor, buha gama	0,4-0,6 l/ha
13.	POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)	Afide, tripsi, musculita alba de seara	30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %)
14.	TRIKA EXPERT	Buha semanaturilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor	10-15 kg/ha
15.	ALVERDE	Omida fructificațiilor, larve L1-L3	0,1 % (1,0 l/ha/1000 l apa)
16.	SIVANTO PRIME 200 SL	Afide (Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae); Musculițe (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)	0,56 L/ha
17.	VOLIAM TARGO	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha
18.	GRIAL / (DIEDRO - a doua denumire comerciala)	Afide, omizi	0,5 L/ha (50-166 mL/hL)
19.	VERTIMEC PRO	Păianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha
20.	MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)	Tripsul californian	0,04%
21.	FASTER 10 CE	Păduchele verde	0,02% (0,2 l/ha)
22.	VYDATE 10 L	Nematozi (nematodul tulpinilor si bulbilor, nematozii cu chisti, nematozii galicoli, Pratylenchus, Tylenchulus) Insecte (omida miniera, musculita alba de sera, afide,	10 L/ha, câmp

		musculita tutunului, paduchele verde al piersicului, tripsul tutunului)	
		Nematodul galicol al radacinilor, musculita alba de sera, musca miniera a solanaceelor	10 L/ha, sera si solarii
23.	VYDATE 10 G	Musulita alba de sera, nematozii galicoli, nematodul tulpinilor	30,0-55,0 kg/ha, câmp, sera si solarii
24.	LIMOCIDE	Thrips tabaci	4,0 L/ha, sere
		Trialeurodes vaporariorum (Musculita alba de sera)	2,0 L/ha, sere
25.	FLIPPER	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha, câmp
		Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha, spatii protejate)
26.	APACHE / (VERTAB - a doua denumire comerciala)	Musca miniera, seră	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel
		Musca miniera, câmp	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl)
		Acarianul rosu comun, acarianul lat, câmp	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl)
27.	AZATIN EC	Afide, Trialeurodes vaporariorum, Leptinotarsa decemlineata, Liriomyza spp., Noctuide (Trichoplusia ni, Helicoverpa armigera, Autographa gamma, Mamestra brassicae, Spodoptera exigua), Tripsi, Tuta absoluta	1,0 - 1,5 L /ha, sere Se aplică la avertizare.
28.	BACTOSPEINE DF / (DIPEL DF - a doua denumire comerciala)	Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha, sere
29.	BERMECTINE	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL), sere
		Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL), sere
		Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL), sere
		Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL), câmp
30.	PREV GOLD	Acarieni (Tetranychus urticae), Musculita alba (Trialeurodes vaporariorum)	0,4-0,8% (maxim 8 L/ha)
31.	SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inlforitului.
32.	HARPUN	Musulita alba de sera	75 ml/100 L apa, solarii
33.	JUVINAL 10 EC	Musulita alba de sera	0,05%, solarii
34.	DELTAM	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 mp
		Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 mp
35.	MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)	Helicoverpa armigera (Omida fructelor), Macrosiphon euphorbiae (Paduchele verde al solanaceelor)	0,05% (0,5 L/ha în 1000 L apa)
36.	VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua denumire comerciala)	Omida capsulelor (larve L1 - L2)	0,02 % (0,2 l p.c. /ha)
37.	VERTIMEC 1,8% EC	Acarieni	60 mL/hl, câmp
		Musca miniera	60-80 mL/hl, sera
		Acarieni, tripsul californian, musca miniera, tripsul comun, acarieni galicoli,	60-80 mL/hl, spatii protejate
38.	LASER 240 SC	Musca miniera a solanaceelor	0,05%
39.	SANIUM SYSTEM	Afide (Aphis gossypii, Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae); Trialeurodes vaporariorum (Musculita alba de sera)	4,5 L/ha, sere și solarii
40.	MINECTO ALPHA	Tripsul californian, musculita alba de sera, omizi defoliatoare, omida fructelor, musca miniera, molia tomatelor	1,0-1,25 L/ha (1,0 L/ha-irigare prin picurare sau 1,25 L/ha-pulverizare)
41.	NOFLY WP	Musulita alba de sera	200-250 g/hl

42.	REQUIEM PRIME	Musulita alba de sera, musulita alba a bumbacului, tripsul californian, acarianul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha
43.	SANMITE 10 SC	Paianjenul rosu al pomilor, acarianul rosu comun, musulita alba de sera, musulita tutunului	1,5 L/ha
44.	SPRUZIT	Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide)	6,0 L/ha in 600 L apa (talie plantei <50 cm)
		Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide)	9,0 L/ha in 900 L apa (talie plantei 50-125 cm)
		Aphis gossypii, Aulacorthum solani (Afide)	12,0 L/ha in 1200 L apa (talie plantei >125 cm)
45.	CYPERGUARD 25 EC / (FOSTOC - a doua denumire comerciala)	Paduchele solanaceelor, gandacul din Colorado	0,008%
46.	DELMUR	Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis, Agrotis segetum, Heliothis sp., Chrysodeixis calcite, Autographa gamma, Tuta absoluta.	500 mL/ha

ACARICIDE

Nr. crt.	Produs de protectie a plantelor	Agent daunator	Doza
1.	NISSORUN 10 WP	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha
2.	KANEMITE SC	Paianjenul rosu comun	In spatii protejate 1,25 L/ha in 1200 L apa
3.	MOVENTO 100 SC	Tetranychus urticae (Acarianul rosu comun)	0,75 L/ha
4.	VERTIGO 018 EC	Acarianul stacojiu	0,05 %

ERBICIDE

Nr. crt.	Produs de protectie a plantelor	Agent daunator	Doza
1.	BUZZIN	Buruieni dicotiledonate si unele monocotiledonate	0,50 kg/ha aplicat la plantare
2.	MATECOR EXPRESS	Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: teisor, stir, scanteiuta, spanac salbatic, meisor, iarba barboasa, euforbia, fumarita, sugel puturos, raigras, musetelul, firuta, hrisca, grasita, mohor, mustar salbatic, susai, rocoina, urzica, ventrili	0,4 kg/ha Se aplica pretransplantare
		Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale: teisor, stir, scanteiuta, spanac salbatic, meisor, iarba barboasa, euforbia, fumarita, sugel puturos, raigras, musetelul, firuta, hrisca, grasita, mohor, mustar salbatic, susai, rocoina, urzica, ventrili	0,4-0,75 kg/ha Se aplica post rasarire si post-transplantare, stadiul de 8-9 frunze (BBCH 18-19)
3.	SHARPEN 40 SC / (PENDISOL 40 SC - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate	3,3-4,1 l/ha se aplica preemergen cu 2-3 zile inainte de plantare
4.	STOMP AQUA / (PROWL AQUA - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate	1,0-3,0 l/ha inaintea transplantari
5.	STRATOS ULTRA /	Buruieni monocotiledonate perene	4 L/ha (aplicat singur)

	(FOCUS - a doua denumire comerciala)		Postemergent
		Buruieni monocotiledonate perene	2L/ha+2L/ha adjuvant (DASH) Postemergent
		Buruieni monocotiledonate anuale	1-2 L/ha (aplicat singur) Postemergent
		Buruieni monocotiledonate anuale	2L/ha+2L/ha adjuvant (DASH) Postemergent
6.	TARGA MAX / (GRAMIN MAX - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale	0,4-0,6 l/ha Postemergent, buruieni monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Shorgum halepense pana la 15-25 cm, Agropyron repens sub cm
		Buruieni monocotiledonate perene	0,6-1,25 l/ha Postemergent, buruieni monocotiledonate anuale 4-6 frunze, Shorgum halepense pana la 15-25 cm, Agropyron repens sub 20 cm
7.	WISH TOP / (QUICK FORTE - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale si perene	0,83-1,25 L/ha
8.	SENCOR LIQUID 600 SC	Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,45 l/ha Preemergent Tomate semanate
		Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,35 l/ha Postemergent (la minim 40 de zile de la tratamentul in preemergență. Tomate semanate
		Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate	0,6 l/ha Preemergent, Tomate transplantate
9.	FUSILADE FORTE	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha Tomate semanate direct in camp
		Buruieni monocotiledonate perene	1,0 l/ha Tomate semanate direct in camp
		Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha postemergent Tomate transplantate
		Buruieni monocotiledonate perene	1,3 l/ha postemergent Tomate transplantate
10.	DEVRIKOL 45 F	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate	3,0-4,0 L/ha se aplica inainte de semanat cu incorporare Tomate semanate direct in camp
11.	DUAL GOLD 960 EC / (TENDER - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (mohor, busuioc salbatic)	1,0 l/ha Preemergent Tomate in camp (cultura infiintat prin rasad)
12.	METOS 960 EC	Buruieni anuale monocotiledonate și dicotiledonate (Setaria, Galinsoga)	1,0 L/ha Se aplica preemergent Tomate transpl., tomate semănate direct in camp.
13.	AGIL 100 EC / (ZETROLA - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 L/ha ,postemergent Tomate transplantate
		Costrei din rizomi	1,0 L/ha ,postemergent Tomate transplantate
14.	METRIPHAR 70 WG	Buruieni dicotiledonate și unele monocotiledonate	0,3 kg/ha Tomate transplantate
15.	PANTERA 40 EC / (RANGO - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale	0,75 l/ha postemergent Tomate transplantate
16.	TARGA SUPER 5 EC	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 l/ha postemergent Tomate transplantate

17.	TITUS 25 DF / (TAROT - a doua denumire comerciala)	Buruieni monocotiledonate anuale și perene și unele dicotiledonate	40-60 g/ha +Trend90, 0,1 % surfactant Postemergent Se aplica primăvara de la prima frunză până la prima inflorescență a culturii (BBCH 11-51)
-----	---	--	--

REGULATORI DE CREȘTERE

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	ATONIK	Obținerea de spor de producție	0,5 l/ha Se aplica de la apariția primelor inflorescențe până la apariția primelor fructe (BBCH 51-71)
2.	SmartFresh ProTabs	Regulator de creștere	0,084 g/ m ³ - se aplica nu mai târziu de 24 de ore, după recoltare
3.	PLANTLINE E4	Combaterea maturizării neuniforme	0,0125 L/m ³ Se aplica la sfârșitul ciclului de producție, timp de 6 săptămâni, noaptea, prin fumigare. Tomate spații protejate

NEMATOCIDE, TRATAMENT SOL

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	AFROMYL	Nematozi	10,0 L/ha Se aplica la plantare / transplantare
2.	BASAMID GRANULE	Nematodul galicol al rădăcinilor	500 kg/ha - se administrează la sol cu incorporare, înainte de plantare
3.	NEMATHORIN 10 G	Nematodul galicol al rădăcinilor	15 kg/ha Tomate sera și solarii
4.	NEMASOL 510	Patogeni, nematozi, buruieni	700 L/ha -se aplica înainte de plantarea răsadurilor Tomate sera
5.	TERVIGO	Nematozii galicoli	5,0 L/ha Tomate spații protejate
6.	VELUM PRIME 400 SC	Meloidogyne sp. (Nematozi), Leveillula taurica (Fainare)	625 mL/ha Tomate sera și solarii
7.	VYDATE 10 L	Nematozi (nematodul tulpinilor și bulbilor, nematozii cu chisti, nematozii galicoli, Pratylenchus, Tylenchulus) Insecte (omida miniera, musculita alba de sera, afide, musculita tutunului, paduchele verde al piersicului, tripsul tutunului)	10 L/ha
		Nematodul galicol al rădăcinilor, musculita alba de sera, musca minieră a solanaceelor	10 L/ha Tomate sera și solarii

Rodenticide, Moluscicide

Nr. crt.	Produs de protecție a plantelor	Agent dăunător	Doza
1.	IRONMAX PRO	Limași	7,0 kg/ha Tomate seră
2.	AGROSAN B	Melcii fără cochilie	15 kg/ha(administrare pe sol, far incorporare) Tomate in camp
3.	SLUXX HP	Melci fără cochilie (limași); Melci cu cochilie	7,0 kg/ha Se aplică uniform pe sol, la începutul infestării.
4.	ARVALIN	Șoarecele de câmp	5 bucăți/galerie